



## **CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI**

**16ª CONFERENCIA**

**11 Marzo 2023**

### **GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA**

#### **MICOSIS DEL NEONATO Y LACTANTE**

Suele estar asociada a la dermatitis del pañal, como consecuencia de la humedad prolongada que favorece la aparición de infecciones micóticas en región perineal y menos frecuentemente vaginales

El tratamiento pasa por la aplicación local de cremas antifúngicas como el sertaconazol (Zalain) u otros. Otra posibilidad es la aplicación de gel o aceite de CALCAREA SULPHURICA\_700.000 K

Los lavados jabonosos son eficaces fuera de los labios mayores y la vagina, donde pueden provocar micosis por destrucción de la flora saprofita.

#### **DERMATITIS DEL PAÑAL**

La zona del pañal pasa la mayor parte del día en contacto con dos sustancias muy irritantes: orina y heces, lo que puede provocar inflamación de la epidermis y aparición de infecciones, fundamentalmente micóticas.

El tratamiento es el mismo que el de la micosis del neonato y lactante.

#### **TRASTORNOS MÁS COMUNES EN LA INFANCIA**

VULVITIS: Irritación pruriginosa vulvar; consideramos aquí las de etiología no infecciosa.

MN-CO 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día ¿CHRYSOLITA?

**PUBERTAD PRECOZ:** Entendemos por tal la aparición de la menarquia en edades precoces inferiores a los 11 años. La aparición de vello pubiano y botones mamarios suele preceder en más de un año a primera menstruación.

La primera actuación debe consistir en supresión de productos hormonados, especialmente la carne de ave.

El medicamento de moderada actividad para frenar parcialmente el proceso es ZINGIBER 700.000 K, 3 gotas 3 veces al día. En su defecto, puede utilizarse el color de regulación violeta (Zincum Metallicum).

**VAGINITIS:** Vaginitis se define como aquel proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que generalmente suele acompañarse de un aumento en la secreción vaginal.

CALCAREA SULPHURICA 700MK: 3 gotas dos o más veces al día. La infección micótica, por Candida Albicans en la mayoría de los casos, remite en dos o tres meses pero es aconsejable continuar con el tratamiento durante un total de 5 meses para evitar las recidivas.

CANDIDA ALBICANS 30 CH o DULCAMARA IBERHOME 170 CH, 3 gotas dos veces al día.

Alejar el jabón de los genitales

## **MENARQUIA Y BACHES AMENORREICOS DE ADAPTACIÓN**

Irregularidades menstruales en los primeros meses o años de la menarquia, sin alteraciones morfológicas, ni hormonales.

FOLICULINUM 7 CH: 7 gránulos dos días por semana

ZINGIBER 700MK: 3 gotas al día, si fuera necesario

## **BACHES AMENORREICOS POR MICROPOLYQUISTOSIS OVÁRICA**

Enfermedad caracterizada por la formación de múltiples quistes foliculares en los ovarios que no pueden ser liberados, dando lugar a ciclos anovulatorios y a un aumento de la tasa de testosterona, que conlleva la aparición de hirsutismo.

La medicina tradicional china indica que todo proceso que cursa con amenorrea supone la hipofunción

PROGESTERONUM 400 CH o 700.000 K: 10 gránulos cada 3-4 días o 3 gránulos en días alternos.

Pulsatilla 700.000 K: 2 gránulos o gotas una o dos veces al día

\*\*\*LAC CANINUM 700MK: 5 gotas dos veces al día o 3 gránulos dos veces al día si es a la 200 CH, asociado a GRAPHITES 700MK, 3-5 gotas dos veces al día

## **SÍNDROME PREMENSTRUAL**

Conjunto de síntomas caracterizados por ansiedad, irritabilidad o depresión, edematización, lumbalgia, mastodinia..., suponen un cambio de carácter de la mujer en los días previos a la menstruación.

FOLICULINUM 7 CH en la mujer joven y 100-200 CH en la mujer adulta.

ARSENICUM IODATUM 700MK: 3 gotas una o dos veces al día, los 3-5 días previos a la menstruación para tonificar el Qi del hígado.

## **QUISTE DE OVARIO**

En cada ciclo hormonal crece un folículo, generador de estrógenos, en el que crece el óvulo. En el caso de que éste no llegue a abrirse para liberar el óvulo, el líquido permanece dando lugar a un quiste, denominado quiste folicular.

En otros casos, el quiste se forma en el cuerpo lúteo tras la expulsión del óvulo dando lugar a un quiste generador de estrógenos y progesterona.

Verde + naranja + negro = AURUM METALLICUM + SULPHUR + PIX LIQUIDA 700MK gotas: 5+5+5, tres veces/día

LAC CANINUM 30 CH GRÁNULOS: 3-0-3

Sepia 200 CH

## **DISMENORREA ESENCIAL EN LA MUJER JOVEN**

Entendemos por tal el dolor menstrual en las mujeres jóvenes con normalidad morfológica y funcional del aparato genital.

Tratamiento:

FOLICULINUM 700.000 K gotas: 9 gotas en días alternos.

ZIZIA AUREA 700.000 K gotas: 5 gotas cada 1-2-4 horas al inicio de la menstruación.

ACTEA RACEMOSA 30 CH?

T.M. de Hamamelis, Hydrastis, Viburnum y Piscidia. (Fasciculus Medicamentorum Naturae. Licenciado: Mariano Samper Padules)

## **CONGESTIÓN PELVIANA POSTABORTO**

Entendemos por congestión pelviana la sensación de peso y dolor constante en la parte más baja del vientre, acompañada de distensión o hinchazón abdominal.

CHRYSOLITA 700MK: tres gotas dos veces al día.

La sintomatología remite en dos meses con carácter definitivo.

## **DISPLASIA DE CUELLO UTERINO O DISPLASIA CERVICAL**

Crecimiento anormal de células en la superficie del cuello uterino. Con frecuencia, la displasia de cuello uterino es la consecuencia de infección por algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH). El diagnóstico se realiza por el examen de un frotis o de una biopsia.

Puede ser leve, moderada o grave, en función de las alteraciones celulares microscópicas y la extensión de la lesión. La displasia de cuello uterino no es una lesión maligna, pero puede degenerar.

Tratamiento: MERCURIUS CORROSIVUS 700.000K + CARBO ANIMALIS 200 CH

La respuesta clínica es irregular: brillante en el 60% de los casos y nula en el 25%, aunque evita la degeneración neoplásica.

## **VAGINITIS MICÓTICA**

*ARSENICUM ALBUM?* *KREOSOTUM?* *NITRICUM ACIDUM?* Candado de seguridad?

CALCAREA SULPHURICA (Yeso cristalizado) 700MK: 7 gotas dos veces al día, durante dos meses. Dado el carácter recidivante de la infección, y para evitar la recidiva, se aconseja tomar 7 gotas al día, durante los tres meses siguientes

DULCAMARA 170 CH Iberhome: 7 gotas dos veces al día

## **PRURITO VULVAR IDIOPÁTICO**

PRURITO = CALOR

COLOR?? MEDICAMENTO ??? PERFIL PSÍQUICO???

## MIOMATOSIS UTERINA

El mioma uterino o fibroma es una tumoración benigna del músculo uterino, cuya aparición está influenciada por el aumento de estradiol respecto a la progesterona. La sintomatología más frecuente es la menometrorragia generadora de anemia, y la dismenorrea.

Desde el punto de vista psicológico, puede pensarse en una persona de vida afectiva y sexual insatisfactoria, que llora con sangre su realidad ingrata.

Desde el punto de vista fisiológico, el mioma o fibromioma, es la modificación del músculo uterino en forma de hipertrofia glandular y muscular, y edema secundario a hiperestronismo.

Esto nos ayuda a comprender los conceptos de medicina tradicional china, que señala la alteración energética de los meridianos de hígado y bazo como responsables de miomatosis y menometrorragias.

Habitualmente estas pacientes tienen uno o varios meridianos de fuego en su horóscopo.

El tratamiento estará orientado hacia la utilización del color rojo apoyado por el negro, con toques de naranja

### Propuesta terapéutica:

PLATINA 700.000 K gotas: 2 gotas dos o tres veces al día

CORINDÓN ROJO (color rojo) 700MK: 5 gotas a desayuno y cena (Berilo Rojo)

Carbo Animalis 700MK: 3 gotas dos veces al día.

\*\*\*\*\*Foliculinum 700.000 K: 15-20 gotas en días alternos. Su misión es reducir el hiperestronismo responsable de la fibromiomatosis.

### Otros medicamentos homeopáticos:

\*\*\*\*\*CORINDÓN ROJO 170 CH gotas: 15 gotas tres veces al día

\*\*\*PULSATILLA 300MK-500MK: 2 gránulos una vez al día. Este medicamento tiene una acción gestagénica, compensadora del hiperestronismo responsable de la enfermedad.

FOLICULINUM 700MK

El tratamiento evita el crecimiento tumoral, pero no logra su desaparición. Con este tratamiento puede evitarse la histerectomía en buen número de casos, pero el tratamiento puede ser parcialmente ineficaz en los úteros polimiomatosos grandes o en los casos de crecimiento rápido del tumor, que conlleva un riesgo de malignización. En estas situaciones debe valorarse cuidadosamente la conveniencia del tratamiento médico o de la cirugía.

## **ENDOMETRIOSIS:**

Entendemos por tal la proliferación de tejido endometrial dentro o fuera de la cavidad uterina, dando lugar a formaciones tumorales de aspecto achocolatado por su alto contenido hemático. Este proceso puede afectar no solo a territorio genital, sino a cualquier territorio peritoneal.

Causas: factores hereditarios, hiperestronismo, alteraciones inmunitarias...

Los síntomas son los propios del hiperestronismo, causante de la enfermedad, la dismenorrea, hipermenorrea con más o menos coágulos, dispareunia, síndrome miccional.

En medicina tradicional china se considera que la enfermedad está causada por una estasis del Qi y un vacío de hígado y bazo. Las mujeres nacidas en los años, meses o a la hora de los meridianos de fuego, son las más proclives a padecer la enfermedad vacío de hígado y bazo.

Tratamientos farmacológicos: anticonceptivos, antiinflamatorios no esteroideos, danazol (derivado del 17 alfa dietiniltestosterona, agonistas de la gonadotropina, progestágenos, danocrina (hormona masculina)

### Propuesta terapéutica:

\*\*\*\*FOLLICULINUM 700.000 K: 15 gotas/día o en días alternos

\*\*\*\*CORINDÓN ROJO 170 CH gotas: 15-20 gotas tres veces al día

GRAPHITES o CARBO ANIMALIS o CUARZO-TURMALINA NEGRA + BERILO ROJO + PLATINA 700MK: 5+ 3 + 2 gotas, tres veces al día. La utilización de los medicamentos portadores de la longitud cromática negra y roja, está destinada a tonificar el vacío de hígado y el déficit de yin, responsables de una reacción descompensada de yang. Platina, portadora de la longitud cromática naranja, permite reducir la respuesta yang y la consiguiente metrorragia.

\*\*\*BOTHROPS 700.000 K gotas: 3 gotas a desayuno

PULSATILLA ??

SEPIA 700.000 K: 5 gotas en días alternos??

Salvia (Extracto Fluido): 10 gotas dos veces al día

## **BARTOLINITIS**

La bartolinitis es la inflamación, infecciosa o no, de las glándulas de Bartolino, situadas a ambos lados de la vagina entre los labios menores y la pared de la vagina, y cuya función es la lubricación vaginal.

La inflamación glandular se produce por obstrucción del orificio de drenaje de la glándula, lo que provoca la retención del líquido provocando una inflamación purulenta acompañada de dolor acentuado por el roce y las relaciones sexuales.

La ropa muy ajustada o el uso continuo de prendas íntimas de lycra podrían favorecer el desarrollo de bacterias que pueden causar esta dolencia. Los DIU y los anticonceptivos hormonales podrían cambiar la consistencia del flujo vaginal favoreciendo la aparición de bartolinitis, pero no parece haber una evidencia definitiva.

La infección suele estar producida por bacterias que normalmente se encuentran en la piel. Es común la infección causada por Escherichia Coli, pero la infección también puede estar producida por estafilococos, estreptococos, y por enfermedades de transmisión sexual, clamidia y especialmente la gonorrea.

En mujeres de edad avanzada puede recomendarse una biopsia para descartar un tumor de glándula de Bartolino subyacente.

Tratamiento: antibiótico (en función del cultivo y antibiograma), antiinflamatorios, quirúrgico (marsupialización o resección glandular).

#### Propuesta terapéutica homeopática:

\*\*ZINGIBER 700MK gotas: 3 gotas dos o tres veces al día

HEPAR SULPHUR 200 CH gránulos: 2 gránulos cada 2-4-6-8 horas

\*\*\*\*CUARZO o SILICEA 200 CH gránulos: 2 gránulos cada 2-4-6-8 horas, para favorecer el drenaje.  
(CUARZO 700.000 K gotas

\*\*\*COLOCYNTHIS Iberhome 170 CH gotas: 7 gotas tres veces al día, mientras dure el proceso de supuración, por leve que esta sea.

AU AG CU FE S 700MK: en caso de infección recidivante

## **DISMORFIA MAMARIA POSTRAUMÁTICA**

Nos referimos aquí a la alteración en el tamaño y morfología mamaria, de manera que una mama es desproporcionadamente mayor que la otra. Con frecuencia este aumento de tamaño de la glándula mamaria es una respuesta de calor a la penetración de frío, como consecuencia de un antiguo traumatismo que la paciente no es capaz de recordar.

COLOR ROJO EN CROMATOTERAPIA SEGÚN AGRAPART o BERILO ROJO 700MK gel, una vez al día

## **MASTODINIA PREMENSTRUAL**

Nos referimos aquí al dolor habitualmente acompañado de congestión o ingurgitación mamaria que suele aparecer en la segunda mitad del ciclo, como consecuencia de un aumento de la tasa de estrógenos.

BRYONIA 30 CH: 2 gránulos al día, en la segunda mitad del ciclo.

FOLICULINUM 700.000 K: 10 gránulos cada 3-4 días.

## **FIBROADENOMA MAMARIO**

Es el tumor benigno más frecuente de la mama. Suele ser un nódulo sólido bien delimitado constituido por tejido fibroso y epitelial.

15-27 años de edad.

BOTHROPS LANCEOLATA 500MK o 700MK: 3 gotas una vez al día, puede inducir una disminución de la capacidad de coagulación y en consecuencia unas reglas más abundantes.

FOLICULINUM 700.000 K: 10 gotas cada 4-7 días, para disminuir la tasa de estrógenos.

CARBO ANIMALIS 700.000 K gel: aplicación local, una vez al día, sobre la zona tumoral, el color negro induce una respuesta de calor y humedad, compensadora de la enfermedad de frío.

Pix Liquida ? Petroleum ?

## **DISPLASIA FIBROEPITELIAL**

Se caracteriza por la existencia de múltiples nódulos con un componente adenomatoso y quístico, que afecta a ambas mamas, dando la impresión a la palpación de bolsa de perdigones.

BOTHROPS LANCEOLATA 500MK o 700MK: 3 gotas una vez al día

FOLICULINUM 200 CH: 10 gránulos cada 4-7 días

CARBO ANIMALIS 700.000 K gel: aplicación local, una vez al día

## **QUISTE MAMARIO O MASTOPATIA FIBROQUISTICA**

Quistes mamarios de contenido seroso en cuya formación interviene, además de los antecedentes familiares, el incremento de la tasa de estradiol respecto a la progesterona.

Verde local: BERILO VERDE 700MK gel: aplicación local una vez al día, en la segunda mitad del ciclo.

FOLICULINUM 200 CH: 7 gránulos cada 3-4 días

BOTHROPS 700.000 k gotas: 3 gotas al día, para contribuir a la desaparición del quiste y evitar tendencias degenerativas.

## **MASTITIS**

Proceso infeccioso, generalmente bacteriano, que afecta a la glándula mamaria dando lugar a edematización, rubor, calor y fiebre.

Es una enfermedad de calor, y para evitar la formación de un absceso debemos instaurar precozmente el tratamiento con color naranja local:

SULFUR 700.000 K gel (color naranja): aplicación local, dos veces al día

ZINGIBER 500.000 K o 700.000K gotas: 3 gotas dos veces al día, como en todos los procesos con tendencia a la supuración.

## **HIPERPROLACTINEMIA Y GALACTORREA**

La galactorrea es la secreción de leche por el pezón fuera de la lactancia.

Aumento de la tasa de prolactina causada por alteraciones tiroideas, por la existencia de un tumor hipofisario, prolactinoma, por tensiones psicológicas, IRC, o de origen desconocido.

Tratamiento: administración de color vía oral:

TURQUESA o BERILO AZUL o TOPACIO AZUL 500MK: 5 gránulos en días alternos

ÁRNICA 700MK ¿color azul?

Normalización de cifra de prolactina en 4-12 meses

## **SECRECIÓN POR EL PEZÓN MAMARIO**

Las mastitis y las galactorreas, aunque las más frecuentes, no son las únicas formas de secreción por el pezón. En ocasiones aisladas algunas neoplasias malignas pueden dar lugar a exudación serosa o sanguinolenta.

Otras veces, los anticonceptivos, tranquilizantes y antidepresivos pueden dar lugar a exudados por el pezón, sin olvidar las alteraciones hormonales provocadas por la fase inicial de la menopausia y/o el hipotiroidismo.

Sin embargo la etiología más frecuente de secreción mamaria es el papiloma intraductal, tumor benigno, habitualmente de tamaño inferior a 1 cm, que suele situarse en las proximidades del pezón. El diagnóstico se realiza, además de la correspondiente palpación mamaria, por ecografía, RNM, y ductograma o galactografía, si es necesario. El tratamiento es la extirpación quirúrgica del nódulo.

Antes y después del tratamiento quirúrgico, sobre todo si no remite la supuración, y para evitar la recidiva del papiloma puede aplicarse el siguiente tratamiento homeopático:

SULFUR 700.000 K gel + MANGANUM METALLICUM 700.000 K gel = color naranja + color amarillo para evitar la irritación tisular

CORINDÓN ROJO Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día. Experiencia limitada

#### Secreción por el pezón mamario

COLOR	POSIBLES CAUSAS
Blanca, turbia, amarillenta o con pus	infección del seno o el pezón
Verde	quistes
Marrón o con apariencia de queso	ectasia del conducto mamario (conducto de leche bloqueado)
Transparente	cáncer de seno, especialmente si solo proviene de un seno
Con sangre	papiloma o cáncer de seno

### MACROCALCIFICACIONES Y MICROCALCIFICACIONES MAMARIAS

Las macrocalcificaciones tienen un carácter de benignidad y no precisan ningún tipo de tratamiento, ni existe. Las microcalcificaciones, muy especialmente si tienden a la agrupación, indican una tendencia a la formación de tumoraciones malignas o son indicativas de la existencia de una tumoración, no siempre identificable por métodos morfológicos.

Biopsia ?

BOTHROPS 700MK: 3 gotas una vez al día

### CÁNCER DE MAMA

Intervención quirúrgica seguida de quimioterapia y radioterapia si es necesario.

Evitar náuseas, vómitos, astenia, y alteraciones hematológicas como leucopenia, anemia y plaquetopenia (OXALICUM ACIDUM).

SEROTONINA 700MK, CUARZO-TURMALINA NEGRA 700MK, FERRUM METALLICUM IBERHOME 170 CH, (ARSENICUM IODATUM, MERCURIUS, OXALICUM ACIDUM)

ZINCUM SULPHURICUM IBERHOME 170 CH: 15 gotas tres veces al día, hepatopatía quimioterápica

Para evitar recidivas: BOTHROPS LANCEOLATA 700MK 500.000 K gotas: de 3-5 gotas al día, durante un mínimo de siete años.

Aspectos psicológicos y Dr. Survek

Estenosis postquirúrgica: C + Na I, Apat

Mucositis postradioterapia: F +Sy

Linfedema postquirururgico o RT: PL17, Pt-UI-Mz

## **HIPEREMESIS GRAVÍDICA**

Náuseas y vómitos en el primer trimestre del embarazo por adaptación hormonal, inmunitaria, digestiva y mecánica del cuerpo femenino al embarazo.

SEPIA 700.000 K gotas o SEPIA 30 CH: 3 gotas dos o más veces al día.

ZINCUM SULPHURICUM IBERHOME 170 CH gotas. 10-15 gotas tres veces al día ¿?

Boldo Extracto Fluido: 15 gotas tres veces al día, es importante no rebasar estas dosis inocuas, pues en altas dosis esta planta medicinal puede tener efectos abortivos.

## **MANTENIMIENTO DEL EMBARAZO**

SULFUR IODATUM 700.000 K o PHOSPHORUS TRIIODATUS 700.000K o CUARZO-PHOSPHORUS 700.000K gotas: 3 gotas dos o tres veces al día.

PLATINA 700.000 K gotas: 3 gotas una o dos veces a día

## **AMENAZA DE ABORTO**

Aparición de pequeños sangrados o perdidas hemáticas de mayor importancia, con o sin dolor abdominal, con alteraciones placentarias o no. El tratamiento que se cita a continuación puede ser eficaz cuando no se ha borrado del cuello uterino, ni hay dilatación del mismo:

PHOSPHORUS TRIIODATUS 700MK gotas: 3-5 gotas cada 2-4-6-8 h.

CUARZO-PHOSPHORUS 700MK : las mismas dosis que el anterior, debemos elegir entre uno y otro, quizás este medicamento es un poco más activo para evitar hemorragias.

PLATINA 700MK: 5 gotas tres o más veces al día. Su acción es algo inferior a los anteriores

SABINA 30 CH: 2 gránulos tres veces al día, acción complementaria de los medicamentos anteriores

## **OLIGOSPERMIA Y OTRAS ALTERACIONES**

Alteraciones del número de los espermatozoides, menos de veinte millones. Con frecuencia va asociada a una alteración de la motilidad de los mismos (astenozoospermia) y de la morfología (teratozoospermia).

Causas: varicocele, efectos secundarios de algunos medicamentos, radiación por pantallas, anomalías testiculares congénitas.

ADULARIA + CUARZO-TURMALINA NEGRA + ZIZIA ÁUREA 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día

MONAZITA? ALLANITA? SUNGITA?

Este protocolo de tratamiento permite mejorar la producción y vitalidad espermática, es de gran utilidad en las alteraciones leves o moderadas, pero la utilidad es de menor importancia en los casos severos.

En caso de infección de vesículas seminales:

AU-AG-CU-FE 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día

SULFUR 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día

¿SEPIA?

## **CONTRACCIONES UTERINAS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL EMBARAZO**

ZIZIA AUREA 700.000 K: 2 gránulos o tres gotas cada dos, cuatro o seis horas. Las tomas pueden espaciarse cada ocho o doce horas en función de la mejoría.

## **PARTO EUTÓCICO**

Nos referimos aquí a los medicamentos clásicos en homeopatía, capaces de estimular una buena dinámica de parto.

ACTEA RACEMOSA 7 CH – 30 CH: 2 gránulos al día, las 3 semanas previas a la fecha probable de parto.

CAULLOPHYLLUM, GELSEMIUM (Denis Demarque)

PULSATILLA?

Cuando el parto se encuentra en curso y las contracciones aparecen cada 15 minutos, es el momento de administrar 20 gránulos de vez, y a partir de ese momento la paciente debe tomar tres gránulos cada 15-20 minutos, para conseguir unas contracciones suficientes y una correcta dilatación del cuello uterino.

## **CICATRIZACIÓN TÓRPIDA DE CUALQUIER HERIDA, EPISIOTOMIA**

Una herida quirúrgica supone la penetración de energía frío en profundidad.

Propuesta terapéutica: color azul en superficie, color rojo por vía interna (Dr.Christian Agrapart):

TURQUESA 700MK gel: aplicación local, una vez al día

BERILO ROJO 700MK gotas: 5 gotas al día, no es prudente administrar este medicamento los 5 días siguientes al parto, para evitar un aumento de sangrado.

Infiltración de los bordes de la herida con PROCAINA AL 2%

Polvo de azúcar, gel de áloe.

Cicatriz queloide: GEL DE ZINCUM METALLICUM 700MK aplicación local (color violeta)

## **LACTANCIA, SUBIDA DE LA LECHE**

LAC CANINUM 50MK: 2 gránulos de tres a cinco veces al día, los primeros diez o quince días después del parto, en los casos en que se retrasa la subida de la leche.

CALCÁREA CARBÓNICA 50MK: 2 gránulos de tres a cinco veces al día, durante el mismo periodo de tiempo que el anterior.

## **GRIETAS DEL PEZÓN**

El tratamiento es el mismo que para cualquier herida, pero alternando el color azul con el negro.

Crema de lanolina al 100%

TURQUESA 700MK gel: aplicación local por la mañana

Carbo Animalis 700MK gel: aplicación local por la noche.

Aceite de CUARZO-TURMALINA NEGRA 700.000 K gotas: disolver 70 gotas en 70 c.c. de aceite, aplicación local, una vez al día

## **PROLAPSO GENITAL**

Descenso de útero y/o vejiga urinaria, por pérdida de tono de los músculos pélvicos, especialmente pubiococcygeos e iliococcygeos. El prolapso puede oscilar entre un mínimo descenso de útero y vejiga, hasta el prolapso vaginal.

Sensación de peso, o de una bola que pesa, incontinencia urinaria.

Tratamientos: cono vaginal, ejercicios de tonificación, ejercicio del ciervo, pesáreo, cirugía, estrógenos

### Tratamientos homeopáticos:

CAUSTICUM 500MK – 700MK: 3 gotas de una a tres veces al día

ARTEMISIA ABSINTHIUM 700MK: 5 gotas tres veces al día

NUX MOSCHATA 500MK – 700MK: 3 gotas de una a tres veces al día

SEPIA 200 CH, CUPRESUS SEMPERVIVENS 700MK

## **AMENORREAS Y METRORRAGIAS EN LA FASE INICIAL DE LA MENOPAUSIA**

LAC CANINUM 500MK o 700MK, en dosis de 3 gotas una o dos veces al día,

La eficacia de este tratamiento puede oscilar entre 6 meses y 2 años, hasta que la menopausia se instaure y la menstruación desaparezca.

## **SOFOCACIONES MENOPÁUSICAS**

La privación hormonal de estrógenos por cese de la actividad ovárica, provoca una progresiva aparición de frío (disminución de la temperatura corporal y ralentización metabólica) y sequedad de piel y mucosas. Las sofocaciones acompañadas de sudoración son un desorganizado intento de compensación del deterioro que supone la menopausia

PROGESTERONUM 700MK: 3 gotas una o dos veces al día en las fases iniciales con abundantes sofocaciones, y 15 gotas una o dos veces a la semana cuando las sofocaciones han remitido

Riesgos: retarda la atrofia uterina y la atrofia del endometrio.

NITRICUM ACIDUM 700.000 K gotas: 7 gotas dos o tres veces al día

CORINDÓN ROJO Iberhome 170 CH??

¿ZINCUM SULPHURICUM 170 CH?

Cromopuntura según Agrapart: rojo en V62 (detrás de maléolo externo del tobillo, alternando uno y otro pie)

## **SEQUEDAD DE MUCOSAS**

PROGESTERONUM 700.000 K gotas: 7 gotas una o dos veces al día

BERILO ROJO 700.000 K gel: aplicación local en V62